



Bochnia, 23 grudnia 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w BOCHNI

Wacław Czaja

**Urzędy Miast i Gmin
z powiatu bocheńskiego**

Nasz znak: PIW.ChZ.5101.8.2024.ND

Dot. sprawy nr: WIW-ChZ.913.41.17.2024 (3) pismo z dnia: 20 grudnia 2024

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz stwierdzeniem w dniu 17 grudnia 2024 roku pierwszego ogniska rzekomego pomoru drobiu u ptaków utrzymywanych w niewoli na terenie województwa małopolskiego w 2024 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty, wiedzy odnośnie tej choroby oraz szczepień drobiu.

Rzekomy pomór drobiu (pseudopestis avium), czyli choroba Newcastle (Newcastle disease, ND), jest jedną z najważniejszych jednostek chorobowych drobiu oraz innych gatunków ptaków egzotycznych oraz dziko żyjących, stanowiąc zagrożenie dla produkcji drobiu na całym świecie. Dzikie ptaki, zwłaszcza sezonowo migrujące, są ważnym wektorem w transmisji wirusów. Choroba szerzy się głównie poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi ptakami, drogą kropelkową i przez zanieczyszczoną ściółkę. Innymi źródłami zakażenia są zanieczyszczony sprzęt, padłe ptaki, woda, pasza i pracownicy fermy. Ludzie i pojazdy mogą z łatwością przenosić wirus pomiędzy kurnikami oraz fermami. Wirus choroby Newcastle nie jest chorobotwórczy dla ludzi, aczkolwiek kontakt z wirusem zjadliwym terenowym lub nawet serotypem szczepionkowym może wywoływać podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz być przyczyną łagodnego zapalenia spojówek. Wśród objawów klinicznych u zakażonych ptaków dominują objawy ze strony układu pokarmowego i nerwowego (np. kręcz szyi), jednak dość często obserwuje się także zmiany patologiczne w obrębie układu oddechowego. W przebiegu łagodnej postaci choroby objawy ze strony układu oddechowego często bywają prawie niedostrzegalne, lecz w formie ostrej potrafią być silnie wyrażone poprzez osowiałość, znaczne zaburzenia oddechowe, spadek nieśności, długo utrzymujące się objawy neurologiczne czy uporczywą biegunkę. Ostra postać choroby zawsze odznacza się zwiększeniem upadków, a w ciężkich postaciach śmiertelność jest bardzo wysoka, obejmując nawet 70% zakażonego stada.

Środki dezynfekujące łatwo niszczą wirus, ale w ściółce może on zachować żywotność nawet przez 2 miesiące, a w ciałach padłych ptaków – nawet przez 12 miesięcy. Zatem podstawowa prewencja opiera się na dobrych procedurach bioasekuracji oraz szerokim stosowaniu szczepień profilaktycznych, a w wielu krajach szczepienia przeciwko chorobie Newcastle stały się obowiązkowe w przemysłowej produkcji drobiu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Partyzantów 6, 32-700 Bochnia
tel.: (14) 612-34-13, fax: (14) 612-34-13 w.26, e-mail: sekretariat@piw-bochnia.pl, www.piw-bochnia.pl



W związku z powyższym Powiatowy lekarz Weterynarii w Bochni przypomina o zachowaniu zasad bioasekuracji wynikających z rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768 z późn. zm.):

- zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zwłaszcza w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;
- utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków;
- przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
- lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków;
- osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych zwłaszcza o zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, na temat liczby padłych ptaków, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.
- powiadamiania organu IW albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu w/w objawów.

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Bochni**

Wacław Czaja

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

